

Số: 07/DBSB-BCĐ

Tỉnh Châu, ngày 06 tháng 6 năm 2023

## DỰ BÁO

### Tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu năm 2023

(Từ ngày 01/6 - 15/6/2023)

Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2023 thời tiết nắng kéo dài, lượng mưa ít. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh, chuột hại cây trồng gây ra đối với sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2023. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã thông báo hướng dẫn cho bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh, chuột hại chủ yếu sau:

#### 1. Cây lúa

- **Đối với chuột:** Bà con nông dân diệt chuột liên tục bằng nhiều biện pháp, trong đó chú ý biện pháp thủ công, bẫy cơ học, ưu tiên dùng các loại thuốc trừ chuột thế hệ mới như Racumin 0,75TP, Storm 0,005% block bait, Bromo 0,005AB... hoặc sử dụng các loại thuốc trừ chuột khác có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, để hạn chế chuột gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

- **Đối với ốc bươu vàng:** Tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng các biện pháp như dùng lưới có mắt lưới nhỏ đặt ở đầu mương dẫn nước để ngăn ốc theo dòng nước vào ruộng, thường xuyên thu gom ốc, ổ trứng trong ruộng, kênh mương, những chỗ trũng đọng nước... để tiêu diệt. Khi phát hiện ốc có mật độ từ 1,5-3,0 con/m<sup>2</sup> trở lên trên ruộng lúa giai đoạn lúa mới sạ đến đẻ nhánh thì sử dụng một trong các loại thuốc sau như: Honeycin 6GR, Anhead 12GR, Moioic 6GR, Andolis 120AB, Pazol 700WP, Aladin 700WP... để trừ ốc.

- **Đối với bọ trĩ, ruồi đục nõn:** Thường xuyên kiểm tra ruộng lúa nếu có tỷ lệ hại cao ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa dùng một trong các loại thuốc sau phun trừ như Actara 25WG, Azorin 400WP, Sutin 5EC, Karare 2,5 EC... đồng thời kết hợp bón bổ sung 2-3 kg DAP/sào để lúa nhanh hồi phục.

#### 2. Cây rau màu và cây trồng khác

- **Đối với sâu keo mùa thu:** Thường xuyên kiểm tra ruộng ngô, khi phát hiện sâu keo mùa thu trên ngô giai đoạn cây con -loa kèn, có mật độ sâu từ 2 –4 con/m<sup>2</sup> trở lên thì dùng một trong các loại thuốc sau như: Radiant 60WP, Proclaim 5WG, Ammate 150SC, Vi-BT 32000, V.K 16WP, Delfin WG 32 BIU, Match 3050EC, Clever 150SC... Chú ý: phun sớm khi sâu đang tuổi 1, tuổi 2 để đạt hiệu quả phòng trừ cao

#### \* Những lưu ý trong phòng trừ sinh vật gây hại:

- Tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột vì gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

-Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là chính; áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt.

-Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sinh vật gây hại phải tuân thủ những quy định về an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

-Phải thực hiện nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách.

-Đọc kỹ hướng dẫn ghi trên bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật trước khi sử dụng.-Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để phòng trừ sinh vật gây hại

Đề nghị bà con nông dân thường xuyên theo dõi, chăm sóc cây trồng để chủ động phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND&UBND xã;
- Thành viên BCD xã;
- Đài truyền thanh (thông báo)
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG BAN**

**Huỳnh Thanh Tuấn**  
**PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN**